

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

Neofen plus 50 mg/g gel *ibuprofen*

Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke.

Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga primjenjivati oprezno kako biste postigli najbolji učinak.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Obavezno kontaktirajte liječnika ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 14 dana.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

U ovoj uputi:

1. Što je Neofen plus 50 mg/g gel i za što se koristi
2. Prije nego počnete primjenjivati Neofen plus 50 mg/g gel
3. Kako primjenjivati Neofen plus 50 mg/g gel
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Neofen plus 50 mg/g gel
6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE NEOFEN PLUS 50 mg/g GEL I ZA ŠTO SE KORISTI

Neofen plus 50 mg/g gel sadrži djelatnu tvar ibuprofen koja pripada skupini nesteroidnih protuupalnih lijekova. Ibuprofen smanjuje bol i upalu.

Neofen plus 50 mg/g gel se primjenjuje za lokalno liječenje reumatskih bolova, bolova u mišićima, bolova u leđima, bolova i otekline izazvanih iščašenjem, istegnućem i ostalim sportskim ozljedama te kod neuralgija (bol uzrokovana oštećenjem živaca).

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI NEOFEN PLUS 50 mg/g GEL

Nemojte primjenjivati Neofen plus 50 mg/g gel:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak lijeka Neofen plus 50 mg/g gel
- ako ste alergični (preosjetljivi) na acetilsalicilatnu kiselinu ili slične lijekove (npr. nesteroidne protuupalne lijekove)
- ako bolujete od astme
- ako imate rinitis (alergijsku hunjavicu) ili urtikariju (koprivnjaču)
- ako imate otvorene rane na koži ili ako imate oštećenu, upaljenu kožu
- ako imate neku bolest kože.

Budite posebno oprezni s Neofen plus 50 mg/g gelom:

- ako imate ili ste imali čir ili neku drugu tegobu sa želucem ili crijevima
- ako ste bolovali ili bolujete od astme ili imate napade zviždanja u plućima pri udisanju zraka
- ako imate tegobe s bubrezima
- ako bolujete od bronhijalne astme ili neke druge alergijske bolesti.

Dijelove tijela na kojima primjenjujete Neofen plus 50 mg/g gel nemojte izlagati sunčevoj svjetlosti, kako bi izbjegli moguću pojavu reakcije preosjetljivosti, npr. kožni osip.

Prekinite s primjenom Neofen plus 50 mg/g gela, ukoliko primijetite pojavu kožnog osipa.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ovo se odnosi i na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

Neofen plus 50 mg/g gel može imati utjecaj na neke druge lijekove, dok neki drugi lijekovi mogu utjecati na Neofen plus 50 mg/g gel. To se naročito odnosi na:

- lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka (npr. atenolol)
- lijekove za razrjeđivanje krvi (npr. varfarin)
- acetilsalicilatnu kiselinu ili druge nesteroidne protuupalne lijekove.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Ne primjenjujte Neofen plus 50 mg/g gel ukoliko ste trudni ili dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka da bi primjena Neofen plus 50 mg/g gela mogla utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Neofen plus 50 mg/g gela

Neofen plus 50 mg/g gel sadrži propilenglikol koji može nadražiti kožu.

3. KAKO PRIMJENJIVATI NEOFEN PLUS 50 mg/g GEL

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi.

Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Neofen plus 50 mg/g gel namijenjen je za vanjsku primjenu na koži.

Nikada nemojte uzimati Neofen plus 50 mg/g gel na usta.

Odrasli, starije osobe i djeca starija od 12 godina

Istisnite 50 do 125 mg (4 do 10 centimetara) gela na oboljelo područje. Gel nježno umasirajte sve dok se u potpunosti ne upije.

Neofen plus 50 mg/g gel ne primjenjujte češće od svaka četiri sata te najviše četiri puta u jednome danu.

Nakon svake primjene ruke treba temeljito oprati, osim ako mjesto primjene nije na samim rukama.

Neofen plus 50 mg/g gel se primjenjuje isključivo na zdravoj, neoštećenoj koži.

Ne primjenjujte Neofen plus 50 mg/g gel na ili u blizini otvorenih rana i ogrebotina. Također, ovaj lijek ne primjenjujte u području spolovila
Ne primjenjujte gel ispod zavoja, flastera ili gaza.

Izbjegavajte dodir Neofen plus 50 mg/g gela s očima. Ako se to ipak slučajno dogodi, treba obilno isprati oči čistom vodom te potražiti savjet liječnika.

Ukoliko ne primijetite poboljšanje nakon 14 dana primjene ili ako primijetite pogoršanje u bilo koje vrijeme tijekom primjene, tada potražite savjet liječnika.

Djeca mlađa od 12 godina

Ovaj lijek se ne smije primijeniti u djece mlađe od 12 godina.

Što morate poduzeti ako ste Neofen plus 50 mg/g gel slučajno progutali

Ako ste slučajno progutali gel, odmah temeljito isperite usta te obavijestite svog liječnika ili se što prije uputite u najbližu jedinicu hitne medicinske pomoći. Uzmite preostali gel ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici, kojima ste se obratili, znali točno koji ste lijek uzeli.

U slučaju gutanja gela može doći do mučnine i povraćanja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Neofen plus 50 mg/g gel može uzrokovati nuspojave.

Navedene nuspojave neće se javiti kod svakoga.

Pri pravilnoj primjeni nuspojave se javljaju rijetko, a rizik nastanka nuspojava je manji jer se ibuprofen primjenjuje lokalno.

Svi lijekovi mogu izazvati alergijske reakcije, ali pojava ozbiljnih alergijskih reakcija je rijetka.

U slučaju da primijetite zviždanje u plućima pri udisanju zraka, poteškoće s disanjem, otekline očnih vjeđa, lica ili usnica ili svrbež (naročito ako je proširen po cijelom tijelu) tada se odmah javite liječniku.

Moguće su i sljedeće nuspojave:

- svrbež ili crvenilo kože
- osjećaj žarenja
- bolne ili vlažne mrlje na koži
- bol u trbuhu (bol u želucu) ili drugi neuobičajeni želučani simptomi

- poteškoće s bubrezima (naročito u osoba koje su u prošlosti imale neku bolest bubrega).

Kod dugotrajne primjene kao i primjene na većoj površini ne može se isključiti mogućnost nastanka sistemskih nuspojava.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. KAKO ČUVATI NEOFEN PLUS 50 mg/g GEL

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Neofen plus 50 mg/g gel se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Neofen plus 50 mg/g gel sadrži

Djelatna tvar je ibuprofen.

1 g gela sadrži 50 mg ibuprofena.

Pomoćne tvari su: levomentol; etanol (96 postotni); propilenglikol; karbomer 940; diizopropanolamin; voda, pročišćena.

Kako Neofen plus 50 mg/g gel izgleda i sadržaj pakovanja

Neofen plus 50 mg/g gel je proziran, mirisa na mentol. Kada je izložen zraku, vanjski sloj gela se zamuti i postaje bijelo obojen.

15 g, 50 g ili 100 g gela u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Uputa je zadnji puta odobrena u srpnju, 2013.